

پستانها ممکن است به طور اولیه کوچک باشند و یا این که از نظر بیمار اندازه دلخواه نباشد. در این موارد با استفاده از پروتز بیمار تحت عمل بزرگ نمودن پستانها قرار می گیرد و در مواردی مثل سندرم مادرزادی یکی از سینه ها کوچک است با اصلا وجود ندارد.

پستان را میتوان با استفاده از تزریق چربی نیز بزرگ نمود که در این روش در مواردی که پستان خیلی کوچک نیست به کار می رود چون نیاز به تزریق مجدد دارد بعنوان یک روش دائمی توصیه نمی شود

استفاده از ژل در مواردی که بدنبال اعمال جراحی در محلهایی که دچار فرورفتگی است کاربرد دارد ولی برای کل پستان روش مناسبی نمی باشد.

بهترین روش استفاده از پروتز می باشد که پروتز معمولا در انواع مختلف وجود دارد. پروتز نوع حاوی محلول سرم نمکی و یا پروتز Gelfilled که حاوی ژل سلیکون می باشد نوع سوم که حاوی ژل و هم می توان سرم نمکی موجود در آن را کم یا زیاد نمود.

پروتز را میتوان در زیر عضله پستان و یا در زیر بافت غددی روی عضله قرار داد.

محل برش می توان در شیار زیر پستان یا در ناحیه دور آریول و یا از برش زیر بغل باشد.

از عوارض عمل ممکن است عدم سازگاری با بدن و یا عفونت و یا تشکیل کیسول باشد که این عوارض کم است.

پس از پروتز ظاهر سینه كاملا طبيعي است و قوام سینه كاملا طبيعي است در مواردی كه پروتز در زیر عضله می باشد هیچگونه اشكالی برای شیردهی ندارد.