

پلك ها به مرور زمان دچار افتادگي و داراي چروك و داراي پف مي شوند . افتادگي پلك ها ممكن است همراه با افتادگي ابروها باشند كه لازم است كه ابروها و پيشاني نيز بالا برده شود پلك مجموعه اي از عضلات مخصوص باز نمودن و بالا بردن پلك و بك لايه نگهدارند و سپتوم است و ضمنا چربي در دو طرف ناحيه وجود دارد ولي پس از آن با افزايش سن يا به دلایل ديگر ممكن است چربي از ناحيه سپتوم به بيرون زده شود و جهت پف چشم را ايجاد مي نمايد عمل بلغاروپلاستي شامل برداشتن پوست و چربي اضافي و ترميم سپتوم بشرح اوربيتال است كه ميتوان براي هر چهار پلك ايجاد نمود محل انسزيون و برش بسيار ظريف مي باشد و به زردي كم رنگ و محو مي شود اين عمل را ميتوان با بيحسي موضعي و با بيهوشي عمومي و يا به صورت سرپايي انجام داد .

از عوارض عمل ممكن است حالت التهاب يا باز نمودن پلك ها هنگام خواب و يا نامساوي بودن دو چشم باشد كه به تدريج رفع مي شود و يا با عمل جراحي مجدد قابل حل مي باشد. در موارد علت افتادگي پلك افتادگي بيش از حد ابرو و پيشاني است كه با بالا بردن ابرو و Lifting پيشاني حل مي شود.